



Fezes - Pesquisa de *Enterobius vermicularis*

O parasita *Enterobius vermicularis* (oxiúros) pesquisa-se sobretudo em crianças com prurido anal; a pesquisa é feita nas pregas da região perianal:

- Devem ser colhidas três amostras em dias diferentes.
- A colheita deve ser feita logo pela manhã, ao acordar, antes de o doente evacuar e antes de se lavar.
- Utilizar uma zaragatoa e soro fisiológico, fornecidos pelo Laboratório.
- Deitar umas gotas de soro fisiológico na ponta da zaragatoa.
- Com a zaragatoa já humedecida, esfregar a ponta da zaragatoa na prega cutânea peri-anal.



Fezes

- Defecar para um recipiente limpo e seco.
- Depois, com a ajuda de uma espátula, recolher uma pequena porção de fezes que contenha muco, pús ou sangue.
- A porção **deve** ter o tamanho de uma noz (**NÃO ENCHER O RECIPIENTE**), e transferir para o(s) recipiente(s) que recebeu.
- **Fechar bem a tampa (todos)** e agitar (**apenas ETM ou Proto-Fix** para misturar o meio com a amostra).

Conservação até entregar no Laboratório:

Conservar a amostra refrigerada (máximo 2 dias).

Deverá receber os seguintes contentores:

Calprotectina



Exame bacteriológico
Pesquisa de *Clostridioides difficile*



E / OU



Pesquisa de sangue oculto
(3 amostras em 3 dias consecutivos)



Exame Parasitológico (Cada amostra é colocada apenas num recipiente; a ordem é indiferente)



SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Instruções de colheita

EXPETORAÇÃO

E

FEZES

A colheita é realizada pelo próprio utente.

O material de colheita é-lhe fornecido pelo serviço requisitante.

Deve ler com atenção as instruções antes de efetuar as colheitas.

As amostras devem ser entregues no secretariado do Serviço de Patologia Clínica.

Secretariado do Serviço de Patologia Clínica:

Hospital de São Francisco Xavier (HSFX)
Tel.: 210 431 303/4

Hospital de Santa Cruz (HSC)
Tel.: 210 433 202/06

Hospital de Egas Moniz (HEM)
Tel.: 210 432 537

Microbiologia e Biologia Molecular
210 432 539/40

Horário atendimento: 8 -16 h dias úteis

Expetoração Exame bacteriológico

A expetoração deve ser colhida preferencialmente:

- Em jejum, após ter escovado bem os dentes utilizando apenas água (não usar pasta de dentes nem antissépticos).
- Antes de iniciar a antibioterapia.
- Remover as próteses dentárias (dentaduras).
- Colher expetoração que é emitida por tosse profunda (**saliva não**);
- Colher o produto em recipiente estéril de boca larga com tampa de rosca (colher cerca de 2 ml).
- Enviar de imediato ao laboratório.

Conservação até entregar no Laboratório:

- Se o envio ao laboratório for superior a 2 horas, deve refrigerar a amostra.



Expetoração Pesquisa de *Mycobacterium tuberculosis*

A expetoração deve ser colhida preferencialmente:

- Em jejum, após ter escovado bem os dentes utilizando apenas água (não usar pasta de dentes nem antissépticos).
- Antes de iniciar a antibioterapia.
- Remover as próteses dentárias (dentaduras).
- Colher expetoração que é emitida por tosse profunda (saliva não); colher o produto em recipiente estéril de boca larga com tampa de rosca (colher cerca de 2mL).
- Colher até 3 amostras em dias consecutivos. Cada amostra deve ser entregue no laboratório no próprio dia em que é colhida (caso não seja possível, devem ser conservadas no frigorífico e enviadas ao laboratório no último dia).

Conservação até entregar no Laboratório:

- Se o envio ao laboratório for superior a 2 horas, deve refrigerar a amostra.